

Hjortevildtforvaltning

En aktiv hjortevildt forvaltning indeholder mange elementer, som tilsammen skal sikre en bæredygtig udvikling af hjortevildtet.

Herunder er samlet en række anbefalinger til aktiv hjortevildtforvaltning i praksis. Anbefalingerne er baseret på tilgængelige videnskabelige rapporter, praktiske erfaringer fra skytter og skovfogeder samt andre med indgående kendskab til hjortevildt.

Enhver aktiv hjortevildtforvaltning bør tage udgangspunkt i en forvaltningsstrategi.

En forvaltningsstrategi bør være gældende for størst mulige sammenhængende areal og over en periode på minimum 5 år.

Forvaltningsstrategiens elementer:

1. Målsætning for strategien

- Større/uændret eller reduceret bestand
- Kønsfordeling
- Aldersfordeling
- Adfærd/markskader eller andet

2. Biotoppleje/-tiltag (føde, skjul, hvile)

- Beplantninger
- Udtydninger/rotation

3. Fordringer (sommer/vinter)

- Fodervalg
- Hyppighed/mængde
- Placering/metode

4. Jagtformer/-intensitet

- Driv-, tryk-, pürch- og/eller anstandsagt
- Hyppighed og varighed
- Antal jægere
- Antal/art hunde

5. Øvrige aktiviteter

- Ridning, cykling, skovgæster osv.
- Evt. "ruhezoner"

6. Afskydningsplan

- Hinder/kalve/hjorte

Faktaboks:

- Kronvildtet kan blive ca. 16 år
- En kronvildtbestand vil uden jagt vokse med 14-16% pr. år, hvilket er en fordobling på 5 år (potentiale 30% = fordobling på 2 år).
- En voksen hind vil over 12 måneder bevæge sig over minimum 1.000 ha. (optimale forhold 250 ha.).
- En voksen hjort vil over 12 måneder bevæge sig over minimum 3.500 ha.
- Et stykke kronvildt har en flugt afstand på ca. 3,5 km og op til 25 km. (Stigende ved gentagende forstyrrelser).
- Kronvildtet vil vende tilbage til lokationen efter 0,5-7 dage efter forstyrrelsen. (Stigende ved gentagende forstyrrelser).
- Kronvildtets føde består af: Græsser (50%), Lyng (20-27%), urter(2-18%) og skud fra nåletræer (8-10%). Barkskrælninger op til 2%.
- Landbrugsafgrøder: altædende, forkærlighed for kartofler, raps i tidlig stadie, havre og byg.
- Markskader forårsaget af kronvildt kan opstå hele året.
- Den vigtigste forudsætning for kronvildtets trivsel er forstyrelsesfrie områder.
- En hjorts gevirstørrelse har ikke nogen entydig sammenhæng med hjortens alder – men er en ud af flere indikatorer.

Kilder:

- www.fulgeognatur.dk, Naturhistorisk museum i Århus.
- "Analyse af forvaltningen af kronvildt", SNS 2001, J.nr. SN1996-340.
- Faglig rapport nr. 690 "Hvor nedlægges krondyrene - og hvorfor" (2008).